



DLP - 5-7-86070786

Avertissements[®] agricoles

Abonnement

annuel :

140,00 F

à l'ordre

Régisseur de Recettes

D.D.A. du Nord

SERVICE REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Cité Administrative - 59048 LILLE Cedex - Tél. (20) 52.00.25

STATION D'AVERTISSEMENTS

LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES

Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. (21) 28.27.27



spécial grandes cultures

BULLETIN TECHNIQUE N° 12 DU 12 JUIN 1986

BLES : épiaison, surveiller les maladies, pas de puceron, un peu de cécidomyies

ORGES DE PRINTEMPS : intervention à envisager

BETTERAVES : surveiller les pucerons noirs et les pégomyies

POMMES DE TERRE : mildiou phase épidémique

LIN : 15 cm

COLZA : alternaria

BLES

SITUATION : stade éclatement de la gaine à épiaison.

La septoriose a peu évolué mais les dernières pluies risquent de la faire monter. L'oïdium se développera en cas de chaleur et de forte humidité.

A ce jour les pucerons sont absents. Par contre le lundi 9 juin nous avons observé un petit vol de cécidomyies oranges et un peu de jaunes.

PRECONISATIONS : dès que la septoriose atteint la 3ème feuille, à partir du haut envisagez un traitement avec Sportak MZ, Blédor 3, Volnèbe, Bravo plus, Cereclair.

En cas de septoriose + oïdium, préférez des spécialités polyvalentes à base de Tilt C ou SP ou CT, Impact R ou T, Punch C, Bayfidan D, Corbel Star, Vigil T, Bayleton Triple, Corvet CM.

Aucun complément antipuceron ne se justifie à ce jour.

Surveillez les cécidomyies, les risques seront importants si le temps devient plus calme et doux ($T^{\circ} > 15^{\circ}\text{C}$) et que l'on observe le soir les petits "moucheron" oranges ou jaunes en position de ponte sur les épis de début épiaison à floraison.

ORGES DE PRINTEMPS

Toutes les "belles parcelles" ont dû recevoir un traitement polyvalent (oïdium helminthosporiose) si non le faire dans les prochains jours.

P.44

BETTERAVES

SITUATION : le vol de pucerons noirs commencé depuis 10 jours, a été très ralenti par le froid et les pluies.

Des pontes de pégomyies importantes sont signalées, notamment en Artois.

PRECONISATIONS : surveiller l'évolution des deux phénomènes. A ce jour les traitements ne sont pas justifiés sauf ponctuellement où une betterave sur dix présente des pucerons noirs.

POMMES DE TERRE

SITUATION : on observe quelques dégâts graves de rhizoctone dus au froid : nécrose profonde à la base de la tige entraînant une fragilité.

La phase épidémique du mildiou est franchie.

PRECONISATIONS :

- vous n'avez pas encore traité, protéger de suite vos parcelles avec un contact.
- vos parcelles ont été protégées entre le 9 et le 12 juin, envisager un traitement avec un systémique Pulsan ou Syrdate P avant le 19 juin.

LIN

Stade 15 cm atteint.

COLZA

SITUATION :

Alternaria : les symptômes sont toujours présents sur les feuilles basses. Seul dans le Montreuillois, on observe la présence de taches sur siliques. Dans cette dernière situation, il est impératif d'intervenir surtout si les conditions climatiques lui sont propices : Température chaude 20° et plus, et forte hygrométrie.

PRECONISATIONS : traitez avec un produit à base d'iprodione (Rovral 0,7 kg à 1 kg, Kidan 1,4 l à 2 l) ou avec de la procymidone (Sumisclex 1,5 l)